



LES SIGNES DE L'HÉMORRAGIE

En inhibant le mécanisme de la coagulation du sang, l'anticoagulant peut être associé à des saignements.

La survenue d'un saignement visible ou l'apparition de signes évocateurs d'un saignement interne non visible doit vous conduire à contacter votre médecin. Il est donc important de savoir reconnaître ces signes.



Saignements visibles

- ▶ Saignement des gencives
- ▶ Saignement du nez ou œil rouge (hémorragie conjonctivale)
- ▶ Apparition de « bleus » (ecchymoses, hématomes)
- ▶ Présence de sang dans les urines
- ▶ Règles anormalement abondantes
- ▶ Présence de sang rouge dans les selles ou selles noires
- ▶ Vomissements ou crachats sanglants
- ▶ Saignement qui ne s'arrête pas



Saignements internes non-visibles

- ▶ Fatigue inhabituelle
- ▶ Essoufflement anormal
- ▶ Pâleur inattendue
- ▶ Mal de tête ne cédant pas au traitement
- ▶ Malaise insolite



MES CONTACTS

Dr N° de téléphone

Au quotidien, pour prévenir les incidents hémorragiques :



Éviter les sports dangereux (risque de chute ou de traumatisme)



Soyez prudent si vous manipulez des objets tranchants (couteau de cuisine, outil de jardinage)



Éviter la prise de certains médicaments courants comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sauf si ils vous ont été prescrits par votre médecin

Demander conseil à votre médecin avant de prendre d'autres médicaments

Référence : Carnet AOD – Carnet d'information et de suivi du traitement



Bristol-Myers Squibb

